N° 43.

Observations sur deux polipes uterins extirpés à la même personne à 17 mois de distance

I

Mon intention n'est pas de faire une dissertation sur les polipes uterins; monsieur Levret a beaucoup eclairé cette matiere, et il laisse peu de choses a desirer. X

+ j'exposerai simplement ce que j'ai cru trouver de particulier dans celuy qui fait le sujet de la 2^eme observation

## I observation

Une religieuse agée d'environ 40 ans, depuis 6 ans cachi-me etoit mal reglée, avoit été saignée, purgée plusieurs fois, pris les bains, les eaux minerales, les anti-scorbutiques &c &c sans avoir pû retablir sa santé. elle avoit depuis deux ans des pertes de temps à autre, etoit tourmentée de coliques, de douleurs de reins assez fréquentes; elle rendoit par la vulve une serosité purulente, et de mauvaise odeur, ce qui avoit fait croire au medecin qui l'avoit vu plusieurs fois qu'elle avoit un ulcére à la matrice et consequemment une maladie incurable; il luy avoit prescrit un regime adoucissant, des injections détersives &c.

Mon pere (chirurgien de la maison) et qui demandoit souvent de ses nouvelles) fut fort étonné que depuis plus de 6 mois ce prétendu ulcére, (et qu'on ne luy avoit pas permis de reconnoître par le toucher) n'eut pas fait un progrés plus marqué: ce qui fut que d'aprés les doutes qu'il paroissoit avoir sur l'état de la malade qu'il l'obtint, le 29 octobre 1773, ~~[illegible]~~ il trouva par cet examen le ventre météorisé douloureux

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ARC 39
n° 101

l'hypogastre tendu. il sentit à l'orifice de la matrice un corps irrégulier, assez solide, de la grosseur d'une pomme d'api ordinaire, qui descendoit d'un bon pouce dans le vagin; il ne pût atteindre son pédicule. —
cet examen donna lieu à une perte assez considérable d'après laquelle la tumeur ne parût diminuer ni de volume, ni de consistence. —
ayant alors reconnu la nature de la maladie, il tranquillisa la religieuse en luy disant que le mal n'étoit pas incurable comme on le croyoit, et que si elle vouloit se soumettre a l'opération necessaire en pareil cas, il y avoit tout lieu d'espérer pour sa guérison.
il me proposa de la toucher le lendemain afin que je reconnusse aussi l'état des choses: mais je ne le pû faire que 22 jours après qui étoit le 20. 9bre parceque à la suite de cette perte (qui dura 10 jours) il luy survint de la fièvre, du dévoyement. on fût obligé de la purger deux fois, ce qui occasionna des tenesmes, et des douleurs expulsives qui ne contribuèrent pas peu à la sortie de la tumeur.
je la trouvai alors descendüe dans le vagin, ayant le volume d'un oeuf d'oye, sa surface étoit fort inégale, son pédicule me parroissoit de la grosseur du petit doigt, assez libre dans l'orifice, mais je ne pûs le suivre plus loin; la présence de la tumeur s'y opposoit en se refoulant.
il me paroissoit cependant prendre son origine de la partie laterale droite de la matrice près de son fond. —
cette seconde recherche occasionna aussi une perte, mais moins considérable que la première, probablement parceque

parceque le corps de la tumeur (qui avoit dépassé L'orifice de cet organe) étoit plus au large, les vaisseaux qui rampoient sur sa surface moins comprimés, consequemment moins susceptibles de se déchirer.

Nous decidâmes La nécessité de La ligature. Monsieur Moreau fût mandé en consequence Le sur lendemain 22. 9bre. il La trouva indispensable, et, tout étant prêt, je La fis en conduisant L'anse du fil d'argent Le plus haut possible avec mon doigt, qui fut remplacé avant de serrer, par celuy de monsieur Moreau. Le premier sentiment de douleur fixa le dégrés de constriction que je devois faire. La malade fût saignée, les fomentations, les injections, les Lavemens, &c. furent administrés. je resserrois, suivant les circonstances, tous les jours, ou de deux jour L'un, jusqu'au 2. xbre (qui etoit le 10.eme de L'operation) que je sentis L'instrument libre et Le retirai. je saisis le polype avec mes doigts, et L'eus aisément. je fis une injection, et Le traitement en consequence.

cette Masse polipeuse étoit encore du volume d'un très gros oeuf, quoique putréfiée, elle nous parût recouverte d'une membrane assés epaisse; sur la surface de cette masse rampoient un grand nombre de vaisseaux variqueux et affaissés, elle etoit interieurement toute. chancie. elle pesoit à sa sortie ℥ v. ℥ vj. nous La mimes dans de L'esprit de vin, et 25 jours après elle n'avoit perdue que ℥ vij de son poids —

Le 23ème nous cessâmes nos soins. L'orifice ~~etoit~~ dilaté à y introduire l'extremité du doigt; il se terminoit en entonnoir du côté de son fond; ses bords etoient plus durs et plus épais que dans l'état naturel, il ne restoit que très peu d'écoulement d'une matière glaireuse qui tachoit encor le linge.

Ce polipe, et l'operation en consequence n'ont rien, je l'avoüe, que de très ordinaire, et je n'en aurois pas occupé l'Academie, si la même religieuse n'avoit point été obligée d'~~ess~~ d'essuier l'extirpation d'un second qui s'est présenté avec quelques circonstances, qui m'ont parues singulières.

II Observation

La malade, qui se trouvoit très soulagée depuis son operation, ne jouissoit cependant pas de la bonne santé que nous lui avions fait esperer; elle conservoit toujours un mal aise suite de sa cacochimie, et un léger écoulement glaireux mais inodore. ses regles reparurent trois mois après pour la 1ère fois, et en petite quantité, et reparurent le 4. et le 5ème mois à jour nommé; ce qui nous paroissoit de bonne augure. mais le 7ème mois les jambes ~~[illegible]~~ s'enflèrent, l'enflure montoit, le ventre se tendoit par degrés, les douleurs de reins se firent sentir, elle ne pouvoit marcher que courbée.

elle prit les remèdes indiqués suivant les circonstances.

enfin le 13ème mois après l'opération les urines s'arrêtèrent de tems en tems, l'hypogastre etoit très tendu et circonscrit, elle ne pouvoit uriner que sur un des côtés ou sur le dos.

Monpere fut obligé de La sonder plusieurs fois, et dès La premiere il introduisit son doigt dans le vagin jusqu'au l'orifice de La matrice qu'il trouva dilaté d'une piece de 12 sols, par La présence d'une tumeur ronde, solide lisse qu'on auroit pû prendre pour La tête d'un fœtus. il ne pût aller plus loin, L'orifice offrant trop de résistance; il retira son doigt couvert d'une matiére glaireuse, inodore, et peu sanguinolente. 2 heures après cette visite, elle tomba dans des convulsions violentes, on manda monpere, une potion anti-spasmodique calma L'orage. il proposa les bains et des injections emollientes que La malade refusa absolument, parcequ'elle disoit vouloir mourir dans son état.

Deux mois se passerent, L'enflure augmentoit, on etoit obligé de La sonder Lorsqu'elle n'avoit pû, par La situation ou par La pression sur l'hypogastre, trouver Le moyen d'uriner. elle avoit des tenesmes, des frissons fréquents, mais jusques La les matieres qu'elle rendoit par La vulve n'étoient pas teintes de sang, ni n'étoient de mauvaise odeur.

Vers le 16ème mois (s'étant un jour mise à genou accoudée sur une table pour uriner plus facilement) elle ressentit tout à coup des douleurs si vives, et eût des convulsions si violentes, qu'on crut qu'elle alloit passer.

on envoya promptement au logis, j'arrivai avant monpere: Comme elle etoit sans connoissance, je profitai de cet instant pour La toucher; je trouvai cette tumeur beaucoup plus grosse, plus lisse, et plus dure que la premiére fois

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

que la premiere, je la sentis tres renitente, et en partie descendüe dans le vagin. j'avoüe que je fus d'abord aussi surpris qu'embarassé. je titillai l'orifice + pour solliciter cet organe à se contracter, mais je ne reüssis pas. + de l'uterus

Mon pere arriva comme elle avait entierement recouvré la connoissance, nous convinmes qu'il falloit la mettre dans un bain de fauteuil ou elle resta tranquillement pendant 2. heures. il est tres probable que cette grande crise etoit l'effet de la chute précipitée de la tumeur dans le vagin, duquel il sortit a l'instant environ deux cuillerées de sang, et beaucoup de matieres glaireuses. –

La malade éssuya pendant 4 jours des alternatifs de tenesmes, de douleurs expulsives, de frissons, de convulsions, pendant lesquels elle continua les bains ou elle urinoit en faisant quelques mouvemens, ou pressions sur la région de la vessie.

enfin le 8^eme^ jour au matin les urines s'arreterent tout a coup, et mon pere voulant la sonder trouva cette poche entierement descendüe dans le vagin, elle écartoit même les grandes levres, il fut obligé de se servir de l'algalie. il demanda du conseil, mais la malade le refusa absolument.

Nous y retournâmes mon pere et moy dans l'aprés dînée, et je reconnus effectivement cette poche semblable en tout, à celle qui se présente dans les douleurs d'une femme, dont le travail est fort avancé. nous ne

pûmes

nous ne pûmes la rompre avec nos doigts. j'introduisis (avec précaution) dans le vagin la pointe d'un bistouri pour faire une ouverture qui pût nous permettre de reconnoître l'état des choses. il en sortit (de cette poche) environ ℥ vij d'eau rougeâtre, et a l'instant elle eût une forte douleur expulsive, après laquelle il sortit un flot de sang. nous touchâmes alors et à nud, une tumeur très tendüe, inégale semblable à un placenta et presque du volume de la tête d'un enfant à terme, un moment après la malade nous dit être soulagée: elle eût quatre jours après une perte qui fut d'abord legere, mais qui augmenta à mesure que le pédicule s'étrangloit dans l'orifice. nous l'encourageâmes à subir, sans délai, l'opération, luy disant qu'elle étoit en danger de perir si elle s'y refusoit: elle demanda quelques jours pour s'y préparer, la communauté se joignit a elle.

trois jours après qui étoit le 22 avril 1775 nous l'operâmes. je conduisis l'anse du fil d'argent (comme dans la premiere) jusqu'a l'orifice où j'eus beaucoup de peine à parvenir; je le trouvai assez mollet mais très boursoufflé, le pedicule me parut un peu applati, applati, large d'environ 8. lignes. je serrai cette 1.re fois jusqu'a la plus legere douleur que ressentit la malade. j'en fis autant le soir, et le lendemain matin, parce qu'elle avoit assez tranquillement passé la nuit. —

Le 3. le ventre se tendit, devint douloureux, elle eut de la fièvre, et les urines s'arrêtèrent; La tumeur ~~distendant~~ écartoit considerablement les grandes lèvres.

on avoit déja fait deux petites saignées; j'en fis une troisieme; j'appliquai sur le ventre des flanelles imbibées d'une forte décoction d'herbes émollientes; nous prescrivimes des Lavemens, et injections de même nature, le petit Lait pour boisson, ce qui fut Continué jusqu'au 6, que les accidens se calmerent, et que La tumeur commança a se fletrir: il sortoit par La vulve une sérosité sanguinolente et de tres ~~mau~~ mauvaise odeur. nous fimes des injections vulneraires aiguisées de quelques grains de camphre, et que les infirmieres réiteroient plusieurs fois dans La journée. La malade faisoit usage, de quatre en quatre heures, d'un verre d'apozème fébrifuge.

Le 7me je ressorai, toujours avec La même précaution. Le 8. La tumeur etoit Considerablement diminuée par le dégorgement, et consequemment beaucoup plus libre dans le vagin; je parvins à porter mon doigt jusqu'à L'orifice de L'uterus, et distinguai, autant qu'il me fut possible par La direction du pédicule, qu'il etoit attaché au fond de La matrice; et par son élargissement, que le fond n'étoit pas éloigné de son orifice.

Le 17me jour sentant L'instrument libre je le retirai

ainsi que le polipe, qui quoique putréfié, étoit du volume d'une grosse orange, et pésoit ℥ xi. ʒ j. — il étoit recouvert d'une forte membrane, que nous Enlevâmes. Sa face exterieure étoit variqueuse; En la pressant, elle Laissoit échapper un sang infect. nous ~~la~~ fendimes dans toute son épaisseur, il étoit entièrement charnu, et vers le centre, nous y trouvâmes deux concrétions stéatomateuses, voisines L'une de l'autre, et chacune de La grosseur d'une aveline. il y eut pendant quelques jours une suppuration très putride; nous nous y attendions bien d'après la grosseur du pédicule. —

Nous Continuames les injections anti-putrides, les injections lavemens purgatifs &c &a

La malade jouit aujourd'huy d'une assez bonne santé quoique délicate, les règles sont revenues deux mois après L'operation, mais irregulierement quant au tems, et a La quantité: il sort de tems en tems, par La vulve, un peu de matiere glaireuse que elle appella fleurs blanches. elle eût pendant le 1er mois de sa Convalescence une descente incomplette de matrice; mais L'usage d'un pessaire d'éponge que je lui fis, et quelle porta pendant Cinq semaines obvia à cet accident. L'orifice de cet organe est resté un peu béant et plus épais que dans L'état naturel. —

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

il est tres certain que si j'eusse été appellé <u>précipi-temment, et sans être prévenu</u> pour secourir une femme, en qui j'aurais découvert par <u>le touché</u> une poche aussi bien formée qu'elle étoit chez la religieuse, je me serois attendu à recevoir bientot un foetus à terme, et non un polipe: de plus la poche étant crevée naturellement, ou par art, comme on est quelque fois obligé de le faire lorsqu'elle résiste trop aux contractions uterines; et ayant trouvé dans le vagin un corps spongieux, inégal, et sur la surface duquel rampoient nombre de vésseaux; n'aurois je pas pû le prendre pour le placenta adhérent à cet orifice, et procéder à l'accouchement comme on fait en pareil cas, et cela avec d'autant plus de raison que la malade avoit essuyé les mois précédens plusieurs simptomes de grossesse?

je finis en disant que toutes ces circonstances auroient bien pû en imposer

Fin